

XELIRI

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ชื่อ-สกุล..... อายุ..... Drug allergy.....
HN..... AN..... หอผู้ป่วย.....
สิทธิการรักษา O สปสช. O ประกันสังคม O สวัสดิการข้าราชการ O อื่นๆ.....
BW.....kg Ht.....cm ECOG.....
BSA = (BW x Ht/3600)1/2 =m2
CBC: Hb.....g/dl Hct.....% WBC...../μ ANC...../μl Plt...../μl

XELIRI

BW.....kg Ht.....cm BSAm2
CYCLE ที่..... ให้ยาวันที่..... (ทุก 21 วัน)

Premedication 30 min before chemotherapy

- Ondansetron 8 mg IV push (Day1)
- Dexamethasone 10 mg in NSS 50 ml IV drip free flow (Day1)
- Atropine 0.3 mg SC (Day1)

Chemotherapy

- Capecitabine (1600 mg/m2/day) แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน (day1-14)
- Capecitabine (500 mg)#.....
- Capecitabine (150 mg)#.....
• Irinotecan mg (180 mg/m2) in D5W 250 ml IV drip in 2 hr (Day1)

Atropine 0.3 mg SC PRN ทุก 1-2 ชั่วโมง if patient has diarrhea, abdominal cramps, tearing during day1 of irinotecan infusion

Home Medication

- Ondansetron(4) 2 tab po ac OD day 1-2 #4
- Dexamethasone(4) 1 tab po pc OD day 1-2 #2
- Lorazepam (1) 1 tab PO hs prn for insomnia #10
- Metoclopramide(10) 1 tab po prn q 8 hr for nausea/vomiting #10
- Senokot 2 tabs po hs prn for constipation #20
- Loperamide 2 caps po stat and prn q 2 hr if diarrhea after day1 of irinotecan infusion #20

ถ้าผู้ป่วยมี sign of anaphylaxis
-หยุดยาทันที สังเกตอาการและ V/S จนกลับมาเป็นปกติ notify แพทย์รับทราบ

แพทย์.....
ว.