

## โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

## แบบประเมินความเหมาะสมในการสั่งจ่ายยา

Glucosamine sulfate powder 1.5 กรัมต่อซอง ประเมินทุกครั้งที่สั่งจ่ายยา (สั่งเป็นคอร์สๆ ละไม่เกิน 3 เดือน)

โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และออร์โธปิดิกส์

พิจารณาเห็นว่า ผู้ป่วยชื่อ.....HN.....AN.....อายุ.....ปี สิทธิการรักษา.....เลขประจำตัวประชาชน..... มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประเภท ( ) ผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่..... ( ) ผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....
<b>ข้อห้ามใช้</b> ไม่อนุญาติให้เบิกจ่ายค่ายา Glucosamine sulfate ในกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ๒. ผู้ป่วยที่มีโรคต้อหิน (Glaucoma) เพราะอาจทำให้ความดันในลูกตาเพิ่มมากขึ้น ๓. ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อาหารประเภทกุ้งหรือปูที่มีสาร chitin
<b>ข้อแนะนำในการใช้ยา</b> ไม่ควรใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟต ร่วมกับ Coumadin (รพ.มียา Warfarin) เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่ปกติ
ควรได้ใช้ยากลูโคซามีนเนื่องจาก <b>(ต้องเข้าเกณฑ์ทุกข้อ)</b> ( ) ผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ ไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมจากการบาดเจ็บและโรคอื่น รวมทั้งโรคติดเชื้อและพิการแต่กำเนิด ( ) ข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด โดยพิจารณาจากผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีผล X-ray ตั้งแต่ Kellgren and Lawrence grade ๑ - ๓ เท่านั้น เว้นแต่ในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการผ่าตัด และไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้อเข่ารุนแรง (severe deformity) ( ) ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ ตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตหรือตับบกพร่อง
<b>รายละเอียดเพิ่มเติม</b> 1. สามารถใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟตร่วมกับยากลุ่มบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้าตัวอื่น (Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis: SYSADOA) ได้ และสามารถใช้ร่วมกับยากลุ่มลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ได้ในกรณีที่มีข้อเข่ามีอาการอักเสบมาก ทั้งนี้เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ ไม่เหมือนกัน และมีการออกฤทธิ์เสริมกันในการรักษาอาการของผู้ป่วย 2. ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันได้ โดยมีข้อจำกัดคือ เมื่อผู้ป่วยได้รับยาแล้วต้องมีการประเมินอาการทุก ๓ เดือน หากอาการของผู้ป่วยไม่ทุเลา ให้ถือว่ายานี้ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา 3. แพทย์ผู้รักษาต้องบันทึกอาการ อาการแสดง การดำเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ของผู้ป่วย อย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีผู้ป่วยมารับการรักษา
ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินอาการของผู้ป่วยและสั่งจ่ายยาตามแนวทางกำกับการใช้ยากลูโคซามีนของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0416.2/ว167 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
<b>รายละเอียดการสั่งจ่ายยา Glucosamine sulphate (สั่งยาได้ครั้งละ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน หรือ 84 วัน)</b> 1. สั่งจ่ายยาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นระยะเวลา.....โดยเริ่มตั้งแต่วันที่..... 2. รายละเอียดยาที่สั่งจ่าย (ขนาดที่แนะนำคือ 1,500 mg/วัน) 2.1 รูปแบบ.....ซอง..... 2.2 ความแรงหรือขนาดบรรจุ.....1,500 มิลลิกรัม..... 2.3 จำนวน ..... ซอง

.....  
(.....)

แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่.....

สาขาอายุรแพทย์โรคข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู/ออร์โธปิดิกส์

การส่งเอกสาร

- ส่งที่ห้องยานอกหรือใน (ตามเคสผู้ป่วย)

- เมื่อแพทย์ประเมินแล้ว ท้องยาทำ pop-up note ระบุการประเมิน DUE พร้อมระบุช่วงเวลาในคอร์สนั้นๆ